



Antes de la llegada de los pollitos

- Proporcione un alojamiento con bioseguridad para los pollitos



- Distribuya el material de cama de modo uniforme hasta una profundidad de 2-5 cm (0.8-2 in)
- Presentación del alimento: migaja tamizada sin polvo o minipélet de 2 mm (0.06 in)

- Precalente el galpón al menos 24 horas antes de la llegada de los pollitos
- Temperatura del aire (a la altura del pollito)
 - En todo el galpón: 30 °C/86 °F
 - Crianza por zonas
 - 32 °C/89.6 °F debajo de la criadora
 - 29 °C/84.2 °F en el borde de la criadora
- Temperatura de la cama: entre 28 °C y 30 °C/82 °F y 86 °F
- Humedad relativa: entre el 60 % y el 70 %
- Velocidad del aire <0.15 m/s (30 ft/min)
- Disponga los equipos de manera tal que permitan el acceso sin restricciones al alimento y al agua
- Instale bebederos complementarios cerca del sistema automático



REFERENCIAS

- 80 % de cobertura de papel
 - Comedores de plato automáticos
 - Minibebedores
 - Línea de nipples
- Cantidad de equipo con base en 1000 pollitos

Llegada de los pollitos

- Pese una muestra de pollitos, registre el peso vivo promedio y la uniformidad/%CV



- Compruebe la temperatura de las cloacas de los pollitos (39.4-40.5 °C/103-105 °F)



- Coloque los pollitos sobre el papel de manera rápida, cuidadosa y pareja




- Asegúrese de que haya disponibilidad de alimento y agua
- La intensidad de la luz debe ser de 30-40 lux (2.8-3.7 pie-candela)



Después del alojamiento del pollito

- Revise el comportamiento de los pollitos después de 1-2 horas
- Ajuste el ambiente como respuesta al comportamiento de los pollitos

- Se necesita una ventilación (sin corrientes de aire) para brindar aire fresco, y quitar el gas residual y el exceso de humedad y calor
- Proporcione llenados de alimento que sean pequeños y frecuentes
- Compruebe que el suministro de agua esté funcionando y que los bebederos complementarios contengan agua fresca y limpia
- Revise el llenado del buche de los pollitos



Los pollitos tienen demasiado frío



Los pollitos están cómodos



Los pollitos tienen demasiado calor

Tiempo después del alojamiento	2 horas	4 horas	8 horas	12 horas	24 horas
Objetivo del llenado del buche (% de pollitos con el buche lleno)	75	80	>80	>85	>95